



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Impfbrief als Mitglied in das renommierte WHO Vaccine Safety Net (Netzwerk Impfstoffsicherheit) aufgenommen. Das bedeutet, der Impfbrief erfüllt alle Ansprüche an Vertrauenswürdigkeit, Unabhängigkeit und Ausgewogenheit, die auf dem Gebiet der Information bezüglich Impfungen unerlässlich sind.



Die Stiftung Health On The Net (HON) hat den Impfbrief als vertrauenswürdige Informationsquelle zertifiziert. Kriterien hierfür sind u.A. Sachverständigkeit, Komplementarität, Datenschutz, Zuordnung, Transparenz, finanzielle Aufdeckung, Werbefreiheit und Nachweis von Nutzen und Effizienz.

August 2009

STIKO-Empfehlungen 2009 - die Änderungen

Kurz gefasst das Wichtigste:

- Alle Erwachsenen erhalten einmalig eine Pertussis-Impfung als Kombinationsimpfstoff mit Td
- Auch Kinder unter 13 Jahren erhalten 2 Varizellenimpfungen.
- Pneumokokken werden bei Senioren nur einmalig geimpft, Auffrischung nur bei Indikation.
- Polio wird im Erwachsenenalter nach der vollständigen Grundimmunisierung einmalig aufgefrischt.

Auffrischimpfung aP/ap im Erwachsenenalter

Für alle Erwachsenen empfiehlt die STIKO die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap-Kombinationsimpfung zu verabreichen. Bei bestehender Indikation zur Pertussis-Impfung kann ein Tdap-Kombinationsimpfstoff (Boostrix oder Covaxis) verwendet werden, auch wenn in einem Zeitraum von weniger als 5 Jahren zuvor ein Td-haltiger Impfstoff verimpft worden ist - bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV Kombinationsimpfung Boostrix-Polio oder Repevax).

Tdap: Die Tdap Empfehlung gilt auch für im Verletzungsfall, falls bis dahin noch keine aP gegeben wurde!!

Außerdem wurde die Indikation auf den gesamten Gesundheitsdienst und auf Tätigkeiten in Gemeinschaftseinrichtungen erweitert.

Bisher: Pädiatrie, Schwangerenbetreuung, Geburtshilfe und Gemeinschaftseinrichtungen Vorschule/Kinderheim.

Pneumokokken-Impfung

Als Standardimpfung wird die einmalige Impfung gegen Pneumokokken mit einem pneumokokken-Polysaccharid-Impfstoff bei Personen ab 60 Jahren empfohlen. Wiederholungsimpfungen im Abstand von 5 Jahren sollten nur bei bestimmten Indikationen erfolgen. Hinzugekommen ist die Indikation: vor Organtransplantation und vor Beginn einer immunsuppressiven Therapie. Bei folgenden Indikationen sind eine ggf. auch mehrere Wiederholungsimpfungen mit Polysaccharid-Impfstoff im Abstand von 5 (Erwachsene) bzw. mindestens 3 Jahren (Kinder unter 10 Jahren) in Erwägung zu ziehen (Risiko-Nutzen-Abwägung beachten):

- Angeborene oder erworbene Immundefekte mit T- und/oder B-zellulärer Restfunktion
- chronische Nierenkrankheiten/nephrotisches Syndrom

STIKO - 2009

Zwei Varizellen-Impfungen

Die 2. Dosis Varizellen-Impfstoff sollte im Alter von 15 bis 23 Monaten erfolgen. Der Mindestabstand zwischen zwei Dosen Varizellen- bzw. MMRV-Impfstoff sollte 4 bis 6 Wochen betragen in Abhängigkeit des verwendeten Impfstoffproduktes (bitte Fachinformation beachten). Ungeimpfte 9- bis 17-jährige erhalten bereits jetzt schon 2 Dosen – damit fällt auch die zweite Varizellen-Impfung unter die Empfehlung „Nachholen bis zum 18. Lebensjahr“.

Polio-Auffrischimpfung bei Erwachsenen

Alle Erwachsenen erhalten einmalig eine Auffrischimpfung als Standardimpfung. Die Empfehlung zur regelmäßigen Auffrischung bei Expositionsrisiko (alle 10 Jahre) bleibt bestehen. Bisherige Regel: Erwachsene erhalten nur eine Grundimmunisierung. (HJS-FR)